

Stratamed[®] en Oculoplástica

Dra Cristina Hidalgo Landeros

SOCHOP

SOPANOP



CONFLICTO DE INTERES





Stratamed®

medical use
scar therapy gel



First silicone-based scar therapy gel approved for the use on non epithelialized wounds and compromised skin.

Stratamed[®]medical use
scar therapy gel

The Product

Stratamed[®] can be applied open wounds and compromised skin surfaces including those from:

- fresh incisions and scar revisions
- laser treatments, chemical peels, dermal abrasion
- superficial radio therapy burns.
- late stage healing of wide spread burns

Stratamed[®] can also be used in conjunction with other invasive scar management options to improve overall results, including surgical excision and resuturing, intralesional steroid injections and pressure garments.

Stratamed – International Clinical Program Summary

Stratamed®

advanced film-forming
wound dressing

Ongoing clinical trials

Principal Investigator	Country	Prevention and/or Treatment	N	Planned date for completion	Targeted publication
Dr Philip Hall	Australia	Treatment	20	July 2018	tbd
Dr. Barry DiBernardo	USA	Treatment	20	December 2018	tbd
Dr Anthony Benedetto	USA	Treatment	334	January 2019	Dermatologic Surgery
Dr Roy Kimble	Australia	Treatment	18	2019	tbd
Natalie Hooke, RN	Australia	Prevention & Treatment	200	2020	tbd

Clinical trials in feasibility stage

Principal Investigator	Country	Prevention and/or Treatment	N	Proposed study
Dr Neil Sadick	USA	Treatment	10	A single-center clinical usage study to evaluate the safety and efficacy of Stratamed® for healing response post-laser tattoo removal treatments
Dr Michael Hammam	USA	Treatment	20	A prospective, randomized and controlled trial to evaluate the efficacy of Stratamed® wound dressing for facial surgical scars
Dr. Amita Singla	Australia	Treatment	40	A flexible wound dressing for the management of genital Lichen Sclerosus
Dr. Davin Lim	Australia	Treatment	40	Safety and efficacy of Stratamed on Asian patient population

Xeragel	Kelo cote	Stratamed
Composición Polisiloxanos+ silicona. Gel de silicona para reducir cicatrices, 100% silicona, transparente, ayuda a reducir el tamaño, grosor, altura y color de todos los tipos de cicatrices, incluyendo cicatrices nuevas y antiguas. Se debe comenzar el tratamiento cuando ha empezado la cicatrización y se han retirado los puntos. No se debe utilizar en heridas abiertas. No se sostiene en mucosa	Composición Dióxido de silicio y Polisiloxanos. (es una combinación de silicio y oxígeno) Gel elaborado a base de silicona. Indicada para el tratamiento de cicatrices recientes o antiguas, queloides, cicatrices hipertróficas, cicatrices de acné. Quemaduras. Cicatrices de cirugías. Al hacer uso de Kelo Cote 15g evitar el contacto con las membranas mucosas, los ojos, heridas y quemaduras de tercer grado. (Solo admite su uso en la cicatriz que realiza la quemadura). Si estás aplicando algún antibiótico o tratamiento para la piel, lo recomendable es No aplicar simultáneamente Kelo Cote. No se sostiene en mucosa.	Composición Polisiloxanos, resina de siloxano. Gel de silicona transparente. Puede aplicarse a heridas abiertas y áreas donde la integridad de la piel ha sido comprometida. Se usa para la prevención y el tratamiento de queloides y cicatrices hipertróficas. También se puede usar junto con otras opciones invasivas de manejo de cicatrices para mejorar los resultados generales, incluida la escisión quirúrgica y el resuturamiento, las inyecciones de esteroides intralesionales y las prendas de presión. Se sostiene en mucosa. Permite su aplicación en heridas abiertas. Permite su uso sobre la herida recién suturada. Permite su uso sobre quemaduras de 1, 2do y 3er grado. Permite su uso junto con otros tratamientos: antibióticos, analgésicos.



EFICACIA Y SEGURIDAD DEL USO DE STRATAMED EN EL CUIDADO DE HERIDAS DE CIRUGÍAS PALPEBRALES.

Investigador:.....

Institución:.....

NOMBRE PACIENTE:.....

EDAD:.....

SEXO:

ANTECEDENTES MORBIDOS: HTA ☐ DM ☐ OTROS:

1. ANTECEDENTES QUIRURGICOS

FECHA CIRUGIA:

NUMERO CONTROL:.....(7 días, 30 y 90 días)

Area tratada	ECTROPION	ENTROPION	BLEFAROPLASTIA	PTOSIS
Parpado Superior				
Parpado Inferior				

PRIMERA FECHA DE APLICACION:.....(solo si no coincide con fecha cirugía)

FRECUENCIA INDICADA: 2 VECES AL DÍA

FRECUENCIA CUMPLIDA POR PACIENTE:

OTROS TRATAMIENTOS:

a)Tópicos en la herida:.....

b) Tópicos en el ojo.....

c) Sistémicos

Durante la cirugía (por ejemplo corticoides EV).....

En el postoperatorio.....

2. DEFINICION DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO CON STRATAMED

a) HERIDA OPERATORIA

Esta escala es comparativa con el standar (lo frecuentemente utilizado por cada investigador)

- DOLOR EN LA HERIDA: dolor experimentado después de la aplicación según paciente
- PRURITO EN LA HERIDA: picazón experimentada posterior a la aplicación
- TIEMPO DE REEPITELIZACIÓN: comparado con practica estándar
- RESPUESTA INFLAMATORIA CICATRICIAL: comparando con practica estándar
- PROPIEDADES DE FORMULACIÓN: como siente la piel, tiempo de sacado, pegajosa, etc
- NORMALIZACIÓN DEL COLOR: comparado con piel circundante
- FACILIDAD DE USO: facilidad en aplicación

-4	stratamed es mucho peor
-3	considerablemente peor
-2	peor
-1	un poco peor
0	stratamed es indiferente
1	es un poco mejor
2	es mejor
3	considerablemente mejor
4	stratamed es mucho mejor

Describir práctica standar:

.....
.....

DOLOR

PRURITO

REEPITELIZACION

RESP INFLAMATORIA

☐

FORMULACION

☐

COLOR

☐

FACILIDAD DE USO

☐

b) SINTOMAS

NINGUNO

☐

SINTOMAS	OD	OI	ODI
OJO ROJO			
SECRECION			
PRURITO			
SENSACION CE			

c) SIGNOLOGÍA OCULAR

NINGUNA

☐

SIGNOS	OD	OI	ODI
HIPEREMIA CONJUNTIVAL			
SECRECION			
QUERATITIS			
ULCERA CORNEAL			

3. TIEMPO DE RECUPERACIÓN


- Produjo Stratamed una cicatrización mas rápida o mejor? SI / NO
- Emplearía Stratamed? SI / NO
- En una escala del 1 (excelente) al 10 (pésimo), cómo calificaría Stratamed

- Necesitó suspender el tratamiento debido a alguna reacción? SI / NO
- Se solucionó la reacción solo con la suspensión del tratamiento? SI / NO
- En caso de que aplique, por cuál tratamiento reemplazó Stratamed:

.....
.....

- Recomendamos a los investigadores un registro fotográfico en cada visita, estandarizada: tomada a un metro de distancia, con zoom de forma tal que ambas orejas aparezcan justo en cada borde lateral de la foto, sin flash)


DISTRIBUCION POR SEXO



mujeres 52
hombres 22

TOTAL 74

TIPO DE CIRUGIA



Resultados

- ❖ Edad 59.2 años (19 - 99 años)
- ❖ seguimiento 7 días 95%
- ❖ seguimiento 30 días 83%
- ❖ Seguimiento 90 días 79%
- ❖ Síntoma y signos oculares 7 pacientes (9,45%)



SINTOMAS	OD	OI	ODI
OJO ROJO			
SECRECION	1		
PRURITO	4		
SENSACION CE			

TIRANTEZ Y EDEMA DOLOROSO 2

TOTAL 7 (9,45%)

SIGNOS	OD	OI	ODI
HIPEREMIA CONJUNTIVAL	1		
SECRECION			
QUERATITIS			
ULCERA CORNEAL	1		

HIPEREMIA O ERITEMA EN LA INCISION 5 CASOS

TOTAL 7 (9,45%)



caso clínicos

protocolo Stratamed









SUPENSIONES 4 CASOS

5,4%









CONCLUSIONES

- ✧ Alternativa segura
- ✧ Costo moderado
- ✧ Alta satisfacción
- ✧ Baja tasa efectos adversos

SOPANOP



SOIREESCONGRESOS@GMAIL.COM

PAQUETE SOPANOP

Con **Inscripción Incluida!!**

SEDE - HOTEL NOW LARIMAR PUNTA CANA

22-26 ABRIL 2020 (4 Noches)

Desde Usd 1,290

PAQUETE INCLUYE:

Hospedaje por 4 Noches según la ocupación sencilla

INSCRIPCIÓN Congreso.

Todas las Bebidas y Comidas incluidas.

Impuestos incluidos.

Maletín del Congreso

Certificado de participación.

Acceso a las sesiones Científicas

Acceso a las actividades Sociales

www.oculoplasticasinfronteras.com

INSCRIPCIÓN

	HASTA 15 DICIEMBRE	HASTA 01 MARZO	DESDE 02 MARZO
Paquete SOPANOP	INCLUIDA INSCRIPCIÓN	INCLUIDA INSCRIPCIÓN	INCLUIDA INSCRIPCIÓN
Fuera Paquete SOPANOP/ En el Hotel SEDE	USD 550.00	USD 750.00	USD 900.00
Otro HOTEL	USD 750.00	USD 850.00	USD 1,000.00
Acompañante Hotel SEDE	USD 100.00	USD 300.00	USD 300.00
Acompañante en OTRO Hotel	USD 300.00	USD 300.00	USD 300.00

Nota importante: Acompañantes en otro hotel solo tienen acceso los días de los eventos sociales (Cóctel de Bienvenida y Cena de Clausura)

Para mayor Información:  solreescongresos@gmail.com  809.732.6873